

L'ACIDO IALURONICO, ALLEATO DELLA BELLEZZA

PER LABBRA PIÙ PIENE O PER CANCELLARE GLI INESTETISMI DELLE RUGHE O DEI SOLCHI NATURALI, GLI ULTIMI RITROVATI SENZA RISCHI PER LA SALUTE. IL **DOTT LADISI** CI SPIEGA I TRATTAMENTI.



Prima di ogni seduta, circa una o due ore prima si consiglia di trattare la zona con uno spesso strato di pomata anestetica, per alleviare i dolori superficiali dell'iniezione sebbene oggi alcuni prodotti contengono già della lidocaina al loro interno, rendendo ciò facoltativo. Ogni seduta dura circa 20-30 minuti in base alle differenti zone da trattare e nelle sei prime ore dopo il trattamento si consiglia di stare a riposo. Un rossore cutaneo ed un leggero edema, la cui importanza varia da un individuo all'altro, possono apparire nelle zone trattate ma generalmente sono di lieve entità e scompaiono nell'arco di uno a tre giorni. Per attenuare ciò, l'uso di una pomata antiinfiammatoria per circa 48h è sempre consigliato. Il risultato definitivo si apprezza dopo qualche giorno, quando il prodotto si è bene integrato nei tessuti. Alla prima visita è sempre prudente segnalare se ci si è sottoposti già a delle iniezioni di prodotti non riassorbibili nella stessa zona, cosa che potrebbe provocare reazioni infiammatorie acute o croniche.

Il principio è molto semplice: si tratta di iniettare un prodotto fluido sotto la pelle sia per rimodellare certe parti del viso o ricrearne il volume, sia per riempire alcuni tipi di rughe o dei solchi naturali. Questa tecnica è destinata dunque al riempimento delle rughe molto profonde, come i solchi naso-labiali o le rughe leonine accentuate situate nella parte della fronte tra le due sopracciglia, all'aumento di volume delle labbra od al suo contorno, alle guance, zigomi, mento, commissure labiali e rughe della marionetta.

L'apparizione recente di prodotti ancora più fluidi permette inoltre di trattare rughe più superficiali come quelle del labbro superiore o altre piccole rughe della parte superiore del viso resistenti al botulino. Il "filler" (riempitivo) più usato attualmente è l'acido ialuronico, che è riassorbibile e non necessita di alcun test preliminare, in quanto, essendo presente già naturalmente nel nostro organismo, non può dare reazioni di tipo allergico (come faceva il collagene di origine animale, non più usato..) ed è immediatamente iniettabile; ne esistono diversi tipi, più o meno reticolati, più o meno fluidi, la cui durata varia da 6 mesi ad un anno a seconda del gel utilizzato ed alla localizzazione dell'infiltrazione. Un prodotto riassorbibile, come l'acido ialuronico, è sempre preferibile ad uno non riassorbibile in quanto questo può dare, a lungo termine, complicazioni molto serie che a volte necessitano di soluzioni chirurgiche.



DOTT. MASSIMO LADISI

Chirurgia Estetica